

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๖

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง แปะฝุ่นโรยตัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕(๒) (๔) (๕) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้แปะฝุ่นโรยตัว เป็นเครื่องสำอางควบคุม

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“แปะฝุ่นโรยตัว” หมายความว่า สิ่งปรุงที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดหรือคอลลอยด์ของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ หรือสารดังกล่าวรวมกันที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่ระคายผิว ซึ่งอาจแต่งกลิ่นหรือสี หรือแต่งทั้งกลิ่นและสีเพื่อใช้แก้ร่างกายหรือเพื่อเสริมความงาม

ข้อ ๓ แปะฝุ่นโรยตัวต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีวัตถุห้ามใช้ ไม่มีวัตถุใดหรือสารใดที่เป็นอันตราย หรือไม่ปลอดภัยในการใช้ ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับเรื่องนั้น

(๒) ไม่มีสารปนเปื้อน เว้นแต่

(ก) สารหนู (arsenic) ไม่เกิน ๕ ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก

(ข) โซลูเบิลแบเรียม (Soluble barium) ในรูปของแบเรียมคลอไรด์ (barium chloride) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน้ำหนัก

(ค)ปรอท (mercury) ไม่เกิน ๐.๕ ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก
 (ง) ตะกั่ว (lead) ไม่เกิน ๒๐ ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก
 (๓) ใช้สีผสมถูกต้องหรือมีปริมาณไม่เกินกำหนด ตามที่ได้กำหนดไว้
 ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
 พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) มีคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนี้

(ก) แบคทีเรีย ยีสต์และราทั้งหมด น้อยกว่า ๑๐๐๐ โคโลนี
 ต่อกรัม (total colony count)

(ข) ปริซึมปีตีฟ โคลิฟอร์ม น้อยกว่า ๑๐ โคโลนีต่อกรัม
 (presumptive coliform)

(ค) ฟีคัล โคลิโด ไม่พบ

(faecal coli)

(ง) สตาฟีโลคอคคัส ออเรอุส ไม่พบ

(Staphylococcus aureus)

(จ) ซูโดโมนาส แอรูจินินซา ไม่พบ

(Pseudomonas aeruginosa)

(ฉ) ซาลโมเนลลา ไม่พบ

(Salmonella spp.)

(ช) โคลอสตริเดียม ไม่พบ

(Clostridium spp.)

คุณภาพมาตรฐานของแป้งฝุ่นโรยตัว ต้องผ่านการตรวจสอบโดย
ใช้วิธีการตรวจแป้งฝุ่นโรยตัวทางจุลชีววิทยาที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ แป้งฝุ่นโรยตัวสำหรับเด็กต้องไม่มีกรดบอริก (boric acid) และ/
หรือเกลือบอเรต เมนทอล (menthol) การบูร (camphor) หรือวัตถุที่มีชื่อเรียก
อย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับวัตถุที่ระบุนี้ และต้องไม่มี
สปอร์กูดจน (Lycopodium-clavatum)

ข้อ ๕ แป้งฝุ่นโรยตัว ถ้ามีส่วนผสมของกรดบอริก (boric acid) หรือ
โซเดียมบอเรต (sodium borate) ต้องใช้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ ๓.๐ โดย
น้ำหนักและถ้ามีส่วนผสมของเมนทอล (menthol) ต้องใช้ในอัตราส่วนไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๐ โดยน้ำหนักและ/หรือการบูร (camphor) ต้องใช้ในอัตราส่วนไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก

ข้อ ๖ ให้ถือว่าข้อ ๓ (๑) หรือ (๒) และข้อ ๔ เป็นการกำหนดวัตถุ
ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรา ๕ (๔) และให้ถือว่า
ข้อ ๓ (๓) เป็นการกำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
ตามมาตรา ๕ (๕) และให้ถือว่า ข้อ ๓ (๔) และข้อ ๕ เป็นการกำหนดวิธีการ
ผลิตและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางควบคุม ตามมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖

อาทิตย์ อุไรรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การตรวจนับจุลินทรีย์ทางจุลชีววิทยา

1. เครื่องมือ (ผ่านการฆ่าเชื้อ นอกจากข้อ 6, 7, 8, 9)

- (1) ช้อนตักสารสแตนเลส (stainless steel spatula)
- (2) บีเปดมีขีดแบ่งปริมาตรความจุ 1.0, 2.0 มิลลิลิตร
- (3) จานเลี้ยงเชื้อขนาด 150x30 มิลลิเมตร, 100x15 มิลลิเมตร
- (4) ขวดฝาเกลียวปริมาตร 250 มิลลิลิตร
- (5) หลอดคนแก้วขนาด 13x100 มิลลิเมตร, 20x150 มิลลิเมตร
- (6) เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
- (7) ตูบเพาะเชื้อ 35±2 องศาเซลเซียส, 25-30 องศาเซลเซียส
- (8) เครื่องนับโคโลนี
- (9) เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex Mixer)

2. อาหารเลี้ยงเชื้อและสารละลายต่างๆ

- 2.1 สารละลายผสมของ Ethanol 80 % และ Hydrochloric acid 1 % ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร
- 2.2 แอลกอฮอล์ (Ethanol) 70 % โดยปริมาตร
- 2.3 สารละลายเจือจางฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (USP) + ทวิน (โพลีซ็อกเซต) 80 ร้อยละ 1 ของน้ำหนักต่อปริมาตร + เปปโตนร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักต่อปริมาตรที่ pH 7.0
- 2.4 อาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ ซึ่งจะโคกล่าวถึงในแต่ละขั้นตอน

3. การเตรียมตัวอย่าง

- 3.1 ทำความสะอาดบริเวณภายนอกภาชนะบรรจุโดยเจมน้ำบริเวณที่ปิด-เปิด ด้วยสารละลายผสมตามข้อ 2.1 หรือ 2.2
- 3.2 เติตัวอย่างน้ำลงในจานเลี้ยงเชื้อขนาด 150x30 มิลลิเมตร ให้ได้น้ำหนักปริมาณ 20 กรัม ซึ่งตัวอย่างน้ำจกจานเลี้ยงเชื้อ 10.0 กรัม ลงในขวดฝาเกลียวที่มีสารละลายเจือจางตามข้อ 2.3 ปริมาตร 90.0 มิลลิลิตร จะได้ตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 1 ใน 10 (10^{-1}) เขย่าให้เข้ากันนาน 15 ถึง 30 นาที แล้วดำเนินการตรวจตามวิธีที่กำหนดต่อไป ตัวอย่างที่เหลืออีก 10.0 กรัม เก็บไว้ตรวจหาเชื้ออื่น เช่น *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *Salmonella* spp., *Clostridium* spp.

4. การตรวจหาจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด วิธีวิเคราะห์

- 4.1 เตรียมและแสดงผลจากบนจานเลี้ยงเชื้อขนาด 100x15 มิลลิเมตร จำนวน 6 คู่ สำหรับใส่ตัวอย่างที่มีความเจือจางตั้งแต่ 10^{-1} ถึง 10^{-6}

- 4.2 เจือจางตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 10^{-1} (ข้อ 3.2) ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ โดยดูดตัวอย่าง 1.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดแก้วขนาด 13x100 มิลลิเมตร ที่มีสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 9.0 มิลลิลิตร จะได้ตัวอย่างที่มีความเจือจาง 10^{-2} ทำต่อไปจนได้ตัวอย่างที่มีความเจือจางครบตั้งแต่ 10^{-1} ถึง 10^{-6}
- 4.3 ดูดตัวอย่างที่เจือจางแล้วในข้อ 4.2 ที่ความเจือจางละ 1.0 มิลลิลิตร ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่แสดงฉลากไว้ในข้อ 4.1
- 4.4 เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Agar ที่ละลายและทำให้เย็นลงถึงอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 ถึง 20 มิลลิลิตร ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มีตัวอย่าง แล้วชยิบจานเลี้ยงเชื้อให้ตัวอย่างและอาหารเลี้ยงเชื้อเข้ากัน ปล่อยให้แห้ง กลับจานเลี้ยงเชื้อ นำเข้าตูบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
- 4.5 นับจำนวนโคโลนีที่เกิดขึ้นเฉพาะจานที่มีโคโลนี 30 ถึง 300 โคโลนี หาค่าเฉลี่ยและความเจือจางแล้วคูณด้วย dilution factor จะได้จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5. การตรวจหาอีส์ต์และรา

วิธีวิเคราะห์

- 5.1 ทำเช่นเดียวกับข้อ 4.1 - 4.3
- 5.2 เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Sabouraud Dextrose Agar ที่ละลายและทำให้เย็นลงถึงอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 ถึง 20 มิลลิลิตร ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มีตัวอย่าง ชยิบจานเลี้ยงเชื้อให้อาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอย่างเข้ากัน ปล่อยให้แห้ง กลับจานเลี้ยงเชื้อ นำเข้าตูบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส นาน 5 ถึง 7 วัน
- 5.3 นับจำนวนโคโลนีแล้วหาค่าเฉลี่ยของทุกความเจือจาง คูณด้วย dilution factor จะได้จำนวนโคโลนีของอีส์ต์และราต่อตัวอย่าง 1 กรัม

หมายเหตุ วิธีคำนวณปริมาณแบคทีเรีย อีส์ต์และราทั้งหมด (Total Colony Count) นำผลในข้อ 4.5 และ 5.3 มารวมกันด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ dilution factor เท่ากัน

6. การตรวจหาจำนวนปรีซิมป์ตีล โคลิฟอร์ม และฟีคัล โคลิ

วิธีวิเคราะห์

- 6.1 ดูดตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 10^{-1} (3.2) 1.0 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานเลี้ยงเชื้อจำนวน 2 จาน
- 6.2 เทอาหารเลี้ยงเชื้อ MacConkey Agar ที่ละลายและทำให้เย็นลงถึงอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 ถึง 20 มิลลิลิตร ลงในจานเลี้ยงเชื้อ (6.1) ชยิบจานเลี้ยงเชื้อให้อาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอย่างเข้ากัน ปล่อยให้แห้ง แล้วกลับจานเลี้ยงเชื้อ นำเข้าตูบเพาะเชื้อ ที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- 6.3 นับจำนวนโคโลนีที่มีสีแดงเข้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นโคโลนีของ ปรีซิมป์ตีล โคลิฟอร์ม

- 6.4 เชื้อเชื้อจากโคไลนในข้อ 6.3 มาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB (Eosin Methylene Blue) ถ้ามีโคไลนที่แสดงลักษณะเลื่อมโลหะภายใต้รีเฟล็กต์ไลท์ และสีน้ำเงินเกือบดำภายใต้ทรานสมิตต์ไลท์ (Metallic sheen under reflected light and a blue black appearance under transmitted light) แสดงว่ามี นีคล โคไล ถ้าต้องการยืนยันผลให้ทำการทดสอบทางชีวเคมี
7. การตรวจหาโคไลนของ สตาฟีโลคอกคัส ออเวอัส (Staphylococcus aureus)
วิธีวิเคราะห์
- 7.1 ใช้ตัวอย่างแบ่งที่เหลือ 2.0 กรัม ใส่ลงในหลอดแก้วฝาเกลียวขนาด 20X150 มิลลิเมตร ที่มี Tryptic Soy Broth (ที่มี NaCl 7.5% น้ำหนักต่อปริมาตร) 18.0 มิลลิตร เขย่าให้เข้ากัน นำเข้าตูบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส นาน 24 ถึง 48 ชั่วโมง
 - 7.2 ถ่ายเชื้อจากข้อ 7.1 มา 1 ลูบ นำไปเกลี่ยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Vogel Johnson Agar นำเข้าตูบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส นาน 24 ถึง 48 ชั่วโมง
 - 7.3 เลือกโคไลนที่มีลักษณะโค้งมนดำเป็นมัน อาจมีสีเหลืองโดยรอบโคไลนหรือไม่ก็ได้มาอย่างน้อย 1 โคไลน ถ่ายเชื้อลงใน Tryptic Soy Agar Slant นำไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส นาน 18 ถึง 24 ชั่วโมง จนมีการเจริญของเชื้ออย่างชัดเจน
 - 7.4 ถ่ายเชื้อจากข้อ 7.3 ลงในหลอดทดลองขนาด 13X100 มิลลิเมตร ที่มี Brain Heart Infusion Broth 0.2 มิลลิตร เติม Plasma 0.5 มิลลิตร ผสมให้เข้ากัน อบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส ตรวจดูปฏิกิริยา Coagulase positive ว่ามีการจับตัวเป็นก้อนแข็งหรือไม่ ทุก 3 ชั่วโมงจนครบ 24 ชั่วโมง โดยใช้จลินทรีย์ที่ทราบว่าเป็นชนิด Coagulase positive และ Coagulase negative เป็นตัวเปรียบเทียบ ถ้าได้ผลบวกก็แสดงว่ามี Staphylococcus aureus
8. การตรวจหาซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)
วิธีวิเคราะห์
- 8.1 ใช้ตัวอย่างแบ่งที่เหลือจำนวนอีก 2.0 กรัม ใส่ลงในหลอดแก้วฝาเกลียวขนาด 25X150 มิลลิเมตรที่มี Tryptic Soy Broth 18.0 มิลลิตร เขย่าให้เข้ากัน นำไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง
 - 8.2 ถ่ายเชื้อจากข้อ 8.1 มา 1 ลูบ เกลี่ยบนจานที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Cetrinide Agar นำไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง
 - 8.3 เลือกโคไลนที่มีสีเขียวบน Cetrinide Agar เชื้อเชื้อแล้วนำมาเกลี่ยบนจานที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Pseudomonas aeruginosa Agar P และ Pseudomonas Agar F นำไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสนาน 24 ถึง 48 ชั่วโมง ตรวจดูการเรืองแสงของโคไลนภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต (รายละเอียดตามตารางที่ 1)

8.4 ยืนยันผลในข้อ 8.3 โดยการเชื้อของโคไลที่สงสัย (ตามตารางที่ 1) ลงบนแถบของ
กระดาษกรอง ซึ่งสามารถละลาย N,N-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
ถ้ากระดาษกรองเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีม่วง แสดงว่าอาจมี Pseudomonas aeruginosa
ถ้าต้องการยืนยันผลแน่นอน ให้ทดสอบทางชีวเคมี

ตารางที่ 1 Morphologic and Diagnostic Characteristics of Pseudomonas aeruginosa
on Selective and diagnostic Agar Media

Media	Cetrimide Agar Medium	Pseudomonas Agar Medium for Detection of Fluorescein	Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin
Characteristic Colonial Morphology	Generally greenish	Generally Colourless to yellowish	Generally greenish
Fluorescence in UV Light	Greenish	Yellowish	Blue
Oxidase Test	Positive	Positive	Positive
Gram Stain	Negative rods	Negative rods	Negative rods

9. การตรวจหาโคลสตริดิอุม (Clostridium spp.)

วิธีวิเคราะห์

9.1 ใช้ตัวอย่างแบ่งจำนวนอีก 2.0 กรัม ใส่ลงในหลอดแก้วฝาเกลียวขนาด 20X150 มิลลิเมตร
ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Cook Meat Medium 20.0 มิลลิลิตร ซึ่งต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
ประมาณ 2-3 นาที แล้วทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จำนวน 2 หลอด (เพื่อ
แยกระหว่างเชื้อที่สร้างสปอร์และไม่สร้างสปอร์) หลอดแรกปิดผิวหน้าด้วยพาราฟินที่ฆ่าเชื้อแล้ว
ส่วนหลอดที่สองต้มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที แล้วจึงปิดทับด้วยพาราฟินที่ฆ่าเชื้อ
แล้วเช่นกัน

- 9.2 นำหลอดทั้งสองไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส โดยตรวจทุก 24 ชั่วโมง นาน 4 วัน ถ้าไม่มีการเจริญของเชื้อทั้ง 2 หลอด แสดงว่าไม่มี Clostridium spp. และ anaerobic bacteria ตัวอื่น
- 9.3 ถ้ามีการเจริญเติบโตของเชื้อให้ทดสอบและยืนยันผลตามวิธีใน Thai Pharmacopoeia 1987 เล่มที่ 1 หน้า 486-487

10. การตรวจหา ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.)

วิธีวิเคราะห์

- 10.1 เตรียมตัวอย่างเช่นเดียวกับที่เตรียมไว้สำหรับหา Pseudomonas aeruginosa ในข้อ 8.1
- 10.2 ถ่ายเชื้อจากข้อ 10.1 มา 1 มิลลิลิตร ใส่ในซีลีไนต์บรอก (Selenite Cystine Broth) ปริมาตร 20.0 มิลลิลิตร ที่เตรียมไว้เซยาให้เข้ากัน นำใส่ตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสนาน 16 ถึง 24 ชั่วโมง
- 10.3 ใช้ลูป และเชื้อจากข้อ 10.2 ลากไปมา (streak) เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยวๆ บนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด ที่เตรียมไว้คือ เอส เอส อะการ์ (S.S Agar) เข้าตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง และบิสมัทซัลเฟตอะการ์ (Bismuth Sulfate Agar) เข้าตู้อบเพาะเชื้อ 35±2 องศาเซลเซียสนาน 48 ชั่วโมง
- 10.4 คลังเพาะเฉพาะของ โคโลนีซาลโมเนลลาบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสองชนิด ทดสอบขั้นต่อไปทางซีรัม และวีสันอนติซีรัม (antisera) ตามวิธีของในหนังสือ Bergey's Determinative Bacteriology ปี 1974

เอกสารอ้างอิง

1. Madden N.J. 1979. Microbiological Method for Cosmetics. FDA BACTERIOLOGICAL 5th Edition.
2. U.S.P. XXII.P. 1479-1484.
3. Lucas P.J., 1977. Microbiological Examination of Cosmetics. Manual of Cosmetic Analysis 2nd Edition.p. 132-140.
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (มอก.152-2518)
5. Thai Pharmacopoeia, 1987. vol. 1 p. 48.